

INFORMATION AU PATIENT AVANT IRRIGATION COLIQUE PAR VOIE TRANSANALE : PERISTEEN

Vous avez rendez vous dans le service de Neuro Urologie et d'Explorations Périnéales du Pr Amarengo pour apprendre la technique des irrigations coliques transanales avec le matériel PERISTEEN (laboratoire Coloplast)

Qu'est ce qu'une irrigation colique transanale ?

Il s'agit d'un lavement effectué par voie anale à l'aide d'une sonde et permettant d'évacuer l'ensemble des matières fécales situées dans le rectum et la partie terminale du colon (le sigmoïde)

Les irrigations coliques par voie transanale s'adressent aux personnes qui souffrent de troubles de l'évacuation des selles ou d'incontinence fécale et pour lesquelles le traitement médical reste insuffisant

Comment va se dérouler cette irrigation ?

Il est nécessaire d'avoir une formation spécifique à la pratique de l'irrigation colique afin d'acquérir la maîtrise du système et ainsi garantir une bonne efficacité. La première séance d'irrigation doit se faire sous le contrôle d'un professionnel de santé (infirmière ou médecin).

Une ordonnance vous a été remis avant votre venue afin d'acquérir le matériel d'irrigation composé de :

- une unité de contrôle avec un ballonnet
- des sondes rectales à ballonnet à usage unique
- des tubulures d'irrigation

Vous devez impérativement venir à la consultation avec votre propre matériel afin d'effectuer la procédure dans le service

L'irrigation se fait avec de l'eau tiède. La fréquence des irrigations peut varier selon les troubles présentés mais est généralement proposée tous les 2 à 3 jours.

Quelles sont les effets secondaires ?

Au décours de l'utilisation de peristeen, veuillez contacter le service si vous constatez :

- la présence de sang dans les selles, des douleurs abdominales, une perte de poids
- une modification de la fréquence, couleur ou consistance des selles.

Avertissement : la procédure d'irrigation colique doit toujours être exécutée avec soin. La perforation de l'intestin est une complication extrêmement rare mais grave et potentiellement mortelle de l'irrigation anale, elle nécessite l'admission immédiate à l'hôpital avec bien souvent une indication chirurgicale

Quelles sont les contre indications ?

Le peristeen est contre indiqué dans les situations suivantes :

- obstruction connue du gros intestin
- affection inflammatoire de l'intestin
- diverticulite ou maladie diverticulaire compliquée
- chirurgie abdominale ou anale récente
- femme enceinte enfant de moins de 3 ans.

Il est recommandé d'effectuer une rectoscopie avant la première séance d'irrigation colique.

L'équipe de Neuro urologie et d'explorations périnéales se tient à votre disposition pour tout renseignement au 01 56 01 70 40.